

13 Constipation

Absence de selles depuis au moins 3 jours, avec prise alimentaire habituelle.

NE PAS OUBLIER :

Une constipation est fréquente chez le sujet âgé. Une diarrhée cache souvent un FECALOME.

DEMARCHE AIDE SOIGNANTE

Eliminer les signes de gravité (fiche).

Vérifier la fréquence habituelle des selles.

Vérifier l'absence de diarrhée dans les jours précédents.

Demander au résident s'il existe une douleur abdominale.

Noter un changement de comportement, l'existence de vomissements ou de saignements.

Regarder si le résident est habituellement sous laxatifs et s'ils ont été pris ou pas.

Transmettre à l'IDE

Si SIGNES DE GRAVITE, appeler le médecin traitant, le 15 ou Médigarde

DEMARCHE IDE

Evaluer l'état général.

Rechercher des douleurs abdominales associées.

Rechercher des signes de gravité (fiche)

Regarder s'il existe la mise en route d'un nouveau traitement.

Faire une extraction fécale au doigt si fécalome.

Si prescription anticipée, individuelle de NORMACOL, l'appliquer ou appliquer le protocole de l'établissement.

Si le résident est sous laxatifs, il faut voir s'il les prend et augmenter, si besoin, en attendant le médecin traitant.

Si le résident n'a pas de laxatifs, adapter le régime alimentaire et appeler le médecin traitant.

Signaler au médecin traitant.

Si SIGNES DE GRAVITE Appeler le médecin traitant, le 15 ou Médigarde.