

14 Vomissements

Emission d'aliments ou de bile, par la bouche, souvent précédés de sensation de malaise et/ou de nausées.

DEMARCHE AIDE SOIGNANTE

Rechercher les signes de gravité (fiche).

Rechercher : Présence de sang, aspect des vomissements (fécaloïdes ?) et fréquence.

Prendre la température.

Rechercher les éléments suivants :

- Toux, fausse route
- Constipation (date des dernières selles)
- Prise alimentaire trop rapide ou repas quantitativement important
- Contrariété psychologiques
- Angoisse

Transmettre à l'IDE

**SI SIGNES DE GRAVITE,
sang, fièvre, ou douleurs abdominales,
Appeler le médecin traitant ou le 15 ou
Médigarde**

DEMARCHE IDE

RECHERCHER SI UNE CAUSE SIMPLE PEUT LES EXPLIQUER.

Prise d'un nouveau traitement

Fausse route, toux

En cas de constipation, suivre le protocole (fiche)

Poursuivre la surveillance : pouls, tension, température, vomissement, diarrhées, douleur abdominale.

EN ABSENCE DE SIGNES DE GRAVITE OU DE RECIDIVE, transmettre au médecin traitant.

**En cas de récurrence ou de signes de gravité,
appeler le médecin traitant ou le 15 ou
Médigarde.**