

15 FIEVRE

La température centrale doit -être inférieure à 37.5°C le matin et à 37.8°C le soir.

Toute température supérieure à 38°C doit nous alerter et à partir de 38°C doit conduire à la recherche de signes de gravité ciblés ci-dessous :

La fièvre est un symptôme courant chez la personne âgée mais labile : peut être inexistante, ou isolée, ou retardée. Elle génère souvent une confusion elle-même à la source d'une modification de comportement.

DEMARCHE AIDE SOIGNANTE

Tout syndrome fébrile doit être vérifié.

- Appeler une IDE si présente
- Résident au repos, Chambre ventilée, Découvrir le résident, Lutter contre une ambiance surchauffée
- Appliquer des linges humides, Mise en place de vessies de glace
- Faire boire le plus souvent si le résident est conscient.
- **Ne pas donner spontanément de paracétamol, en revanche relever l'heure de la dernière prise si le résident en prend systématiquement**
En dessous de 38.5, si la température est bien tolérée, on ne donne pas d'antipyrétique
- Recontrôler au bout d'une demi/ heure la température
- **Rechercher des Signes de Gravité (fiche)**

Si au bout d'une demi-heure la température persiste

Si présence de signes de gravité : Appeler le médecin traitant ou Médigarde ou le 15

DEMARCHE IDE

Rechercher Signes de Gravité (fiche)

Rechercher signes Associés :

Frissons

Toux, Expectoration purulente ou augmentée

Douleurs abdominales, vomissements

Diarrhée

Brulures mictionnelles

Mal de tête

...

Vérifier si un antibiotique a été débuté il y a moins de 48 heures.

Ne pas donner spontanément de paracétamol sauf si prescription anticipée et fièvre mal tolérée

Surveiller les constantes.

APPELER le médecin traitant ou le 15 ou Médigarde.