

# 16 Hémorragie (autre qu'épistaxis)

Appliquer les mesures de protection (AES)

## DEMARCHE AIDE SOIGNANTE

Laisser un soignant près du résident et aller chercher le chariot d'urgence.

- **LE RESIDENT EVACUE DU SANG ROUGE PAR LA BOUCHE :**

Mettre le patient en position demi assise au lit ou en décubitus latéral.

- **LE RESIDENT EVACUE DU SANG ROUGE PAR VOIE BASSE (anus, vagin, méat urinaire)**

Allonger le résident et mettre une protection sèche.

- **FAIRE UN POINT DE COMPRESSION POUR TOUT SAIGNEMENT Externe visible**

- **SURELEVER LES JAMBES.**

**Appeler l'IDE, le médecin traitant, le 15 ou Médigarde.**

## DEMARCHE IDE

**Evaluer** l'état général du résident.

**Vérifier** la provenance du sang.

**Vérifier** la prise d'anticoagulant ou antiagrégant et les ATCD du résident.

1. **LE RESIDENT EVACUE DU SANG ROUGE PAR LA BOUCHE** par toux, vomissement ou les deux
2. **LE RESIDENT EVACUE DU SANG ROUGE PAR L'ANUS**
3. **LE RESIDENT EVACUE DU SANG ROUGE PAR LE MEAT URINAIRE**
4. **LE RESIDENT EVACUE DU SANG ROUGE PAR LE VAGIN**

Dans chaque situation (1 ou 2 ou 3 ou 4) :

Episode unique de faible abondance : signaler au médecin traitant.

Episode Récidivant ou de grande abondance ou continu : Appeler d'emblée le 15