

19 HYPOGLYCEMIE

L'hypoglycémie est définie par une glycémie capillaire inférieure ou égale à 0.6 g/l.

C'est une urgence vitale.

Signes cliniques d'apparition soudaine :

Agitation, syndrome confusionnel, trouble du comportement, sueurs, palpitations, tremblement, malaise, maux de tête, sensation de faim subite, apathie inhabituelle, changement d'humeur, fatigue, vertiges, vision floue...

DEMARCHE AIDE SOIGNANTE

Si glycémie inférieure à 0,6g/l ou forte présomption d'hypoglycémie

RESIDENT INCONSCIENT

Si IDE non présente

Mettre le résident en PLS

Appeler le 15

Si IDE Présente

Mettre le résident en PLS

Appeler le 15

Injection intraveineuse de G10% ou G30% ou sous cutanée de Glucagon en fonction de la prescription médicale.

! Contre indications du GLUCAGON

-En cas d'ivresse aigue
-En cas de traitement par sulfamides hypoglycémiantes (Diamicron, Daonil, Hémidaonil, Amarel, ...)

RESIDENT CONSCIENT

Dans un premier temps :

Resucrer per os **avec des sucres rapides :**

3 morceaux de sucre ou
125 ml de jus de fruits ou
3 cuillères à café de confiture ou de miel

Dans un second temps :

Donner des sucres lents :

un morceau de pain et du fromage ou
une banane ou
des biscuits type « petit beurre »

Contrôle de la glycémie 10 minutes après

Si Glycémie supérieure à 0,6g/l

Retour à l'état de base.

Prévenir le médecin pour réadaptation du traitement

Si Glycémie inférieure ou égale à 0,6g/l

Resucrer de la même façon que la première fois
Re-Contrôler la glycémie 10 minutes après

Enquêter sur les causes éventuelles de cette hypoglycémie