

## 6 Mal de tête (CEPHALEE AIGUE)

### DEMARCHE AIDE SOIGNANTE

- Mettre le résident dans une pièce calme et peu éclairée
- Prendre les constantes habituelles
- Rechercher des Signes de Gravité (Fiche)
- Prendre la température.

#### Rechercher des signes associés :

- Douleur d'un œil, trouble visuel
- Chute récente ou semi-récente (dans le mois qui précède)
- Troubles de l'équilibre, vertiges
- Troubles de la marche
- Propos incohérents apparus de manière récente ou brutale
- Plainte d'avoir moins de force au niveau des bras et des jambes
- Vomissement
- Prise d'antidiabétiques (insuline, anti-diabétiques oraux)
- Tension supérieure à 200 mm de systolique
- Si antalgique prescrit et si besoin, l'administrer.

**Appeler l'IDE  
si  
un ou plusieurs de ces signe(s) existe(nt)  
ou Médigarde  
ou le 15.**

### DEMARCHE IDE

- **Rechercher** l'introduction d'un nouveau traitement
- **Faire une glycémie capillaire** si hypoglycémie suivre la fiche hypoglycémie
- Si céphalée connue et symptômes habituels suivre le protocole du résident si disparition des symptômes après la prise en charge ne pas appeler le 15.
- Si hypertension TA > 200/110 ou/et
- Si souffrance viscérale : troubles visuels, douleurs thoraciques, douleurs abdominales, signes neurologiques

**APPELER le médecin traitant et/ou le médecin coordonnateur ou le 15 ou Médigarde.**