

9 Saignements de nez (EPISTAXIS)

DEMARCHE AIDE SOIGNANTE

Mettre le patient en position ASSISE, en lui maintenant la tête penchée en avant et mettre un gant froid sur la nuque.

Faire moucher le résident.

PLACER, dans la narine qui saigne, de l'Alginate (Type COALGAN R)

puis APPUYER SUR L'AILE DU NEZ pendant 5 à 10 mn sans relâcher.

En règle générale, le saignement s'arrête en 3 à 4 mn.

Prendre la tension et le pouls.

Apprécier le volume de sang perdu.

**Prévenir l'IDE.
En l'absence d'IDE,
si le saignement persiste,
appeler Médecin traitant ou
Médigarde ou le 15.**

DEMARCHE IDE

Regarder si le patient est sous antiagrégant, AINS ou sous anticoagulant et sortir le dernier INR.

Si le résident présente une pathologie hémorragique connue, suivre le protocole spécifique du résident.

Si le saignement est abondant ou persistant (>10mn) et surtout si le patient est sous anticoagulant ou si signe de gravité (fiche)

APPELER le médecin traitant et/ou le médecin coordonnateur ou le 15 ou Médigarde.

Maintenir la pression sur la narine sans enlever la mèche en attendant le médecin.